




PELIGRO

H318: Provoca lesiones oculares graves.
H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P270: No comer, beber, ni fumar durante su utilización.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P280: Llevar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310: Llamar inmediatamente a un médico.
P39: Recoger el vertido.
P501: Eliminar el contenido o el recipiente en un gestor de residuos autorizado.

DOSIS RECOMENDADA

La concentración máxima en las aplicaciones foliares será de 200 cc - 300 cc cada 100 litros de caldo. La dosis recomendada en fertirrigación es de 3-4 litros por hectárea y aplicación.

HORTALIZAS Y PLANTAS INDUSTRIALES

En aplicaciones foliares, aplicar 2-3 tratamientos con 1.000 litros de caldo por hectárea, durante el primer tercio del ciclo vegetativo.
En fertirrigación, aplicar 5-10 litros por hectárea y ciclo en 4 aplicaciones en las épocas de crecimiento vegetativo.

FRUTALES Y CÍTRICOS

En aplicaciones foliares, aplicar 2-3 tratamientos con 1.000 litros de caldo por hectárea cada dos semanas a partir de 20-25 días después de la floración.
En fertirrigación, aplicar 4-12 litros por hectárea y ciclo en 4-5 aplicaciones en la época de crecimiento vegetativo.

MODO DE EMPLEO

Mediante aplicación foliar, disuelto en agua, procurando bañar bien la planta y sobre todo, las hojas jóvenes.

ADVERTENCIAS

Dado su alto contenido en Zinc y Manganese puede presentar problemas con algunos agroquímicos sensibles a los metales pesados. Evitar la mezcla con aquellos productos. Evitar la mezcla con los productos que contengan elementos no queratizados (Fe) (Zn) (Cu) etc...

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

Utilícese sólo en caso de reconocida necesidad.

No sobrepasar las dosis adecuadas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Temperatura almacenamiento: Almacene el producto en un lugar seco, bien ventilado y alejado de la luz solar directa. Temperatura de almacenamiento de entre 0 y 40 °C. Las bolsas parcialmente usadas o dañadas deben cerrarse correctamente.



KISOLI, S.L.
www.kisoli.com
Desde 1976

RIQUEZAS GARANTIZADAS

7% p/p de Manganese (Mn) como sulfato,
soluble en agua 5% p/p de Zinc (Zn) como
sulfato, soluble en agua

Ingredientes: Agua¹ (nº CAS 7732-18-5),
Sulfato de zinc¹ (nº CAS 7446-20-0), Sulfato de
manganese¹ (nº CAS 10034-96-5).

¹Sustancias y mezclas de materiales vírgenes
(CMC1)

Peso neto: 6.75 KG

Contenido: 5LT

ZN+MN-KS®

**CFP 1 (C)(II)(b) ABONO
INORGÁNICO COMPUESTO
A BASE DE ZINC y
MANGANESO**



Fertilizante utilizable en
producción vegetal ecológica
según RCE 834/2007 conforme
a la Norma UNE 142500



KISOLI, S.L. Parc Empresarial Torrefarrera - C/ Camí de les Comes, 5 - 25123 TORREFARRERA (Lleida) - eugenio@kisoli.com

Nº Fabricante: L-0117-E

ZMKS1116

COLORES

CIAN / MAG / ALLO / NEGRO



MATERIAL

Couche

ARANDELA

76

SALIDA



TOPO

NO

REFERENCIA / VERSIÓN / FECHA

**Ref. : Nueva
BA4 - 07/12/22**

Indicar esta referencia para futuras impresiones